



Virkon® S

Potente desinfectante virucida
de amplio espectro



Elimina rápidamente más de 500 cepas de
patógenos causantes de enfermedades,
en condiciones de reales de campo



Redefiniendo la química de la bioseguridad.

Cuando se lanzó en 1986, Virkon® S era el desinfectante para granjas más avanzado de la época. Fue uno de los primeros desinfectantes oxidantes para uso en granjas, y sigue estando a la vanguardia de la bioseguridad avícola tras su uso exitoso contra 500 organismos causantes de enfermedad.

Durante casi 30 años Virkon® S ha fijado nuevas normas en muchos aspectos importantes de la bioseguridad, desde la mejora de los perfiles de seguridad para su manipulación y para los operarios, a la flexibilidad de aplicación y eficacia comprobada en la granja. Si a esto se suma su excelente

estabilidad y el prolongado período de conservación de su formulación en polvo, es fácil comprender por qué gobiernos en todo el mundo mantienen stock de Virkon® S para el control de enfermedades en caso de emergencia.

En un principio, Virkon® S se desarrolló para satisfacer específicamente las necesidades prácticas de bioseguridad de las actividades y la producción agropecuaria. Las potentes propiedades químicas de la formulación de Virkon® S ofrecen un amplio espectro de eficacia con enfoque específico en los organismos que causan enfermedades virales.

Nuevo diseño. La misma ciencia inigualable.

La línea Virkon® de productos desinfectantes ahora se presenta en un envase nuevo y dinámico, compatible con su potente desinfección biosegura. Podrá encontrar los envases con nuevo y mejorado diseño en lo de su proveedor local.

Visite virkon.com para obtener información adicional.





Química líder en la industria, reconocida por gobiernos de todo el mundo.

Virkon® S es un avance científico con características de rendimiento que han definido las normas de bioseguridad. No es de sorprender, entonces, que Virkon® S sea el producto de preferencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación y de gobiernos en todo el mundo a la hora de garantizar la bioseguridad y reforzar la planificación de contingencias para el control de enfermedades en casos de emergencia. El plan AUSVETPLAN de los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda probablemente sea la fuente de referencia de mayor reputación para el control de enfermedades en casos de emergencia. Virkon® S sigue siendo el único desinfectante de marca al que se hace referencia en el AUSVETPLAN de 2008, que declara que “Virkon® S es un desinfectante moderno con propiedades virucidas excepcionales.”

Está comprobado que:

- Elimina más de 500 cepas de virus, bacterias, hongos y levaduras
- Es eficaz contra enfermedad de Newcastle, influenza aviar, *Salmonella* y *Campylobacter*
- Es un desinfectante de bioseguridad potente, de rápida acción, flexible y multiuso

Química comprobada. Resultados comprobados.

Eficacia de amplio espectro comprobada independientemente.

Como parte de nuestro compromiso de mejorar la química, la seguridad y control, hemos invertido grandes sumas en pruebas de seguridad y rendimiento. Virkon® S también cuenta con una importante serie de estudios que respaldan las declaraciones de su Ficha Técnica contra las enfermedades en la lista de la OIE, incluyendo enfermedad exótica de Newcastle y la influenza aviar altamente patógena (peste aviar).

Con *Salmonella*, los estudios confirman que Virkon® S es sumamente activo contra las cepas más prevalentes responsables de intoxicación alimentaria. La eficacia de amplio espectro de Virkon® S está comprobada independientemente contra:



Más de 100 cepas de virus en 22 familias virales
Más de 400 cepas de bacterias
Más de 60 cepas de hongos y levaduras

Estos estudios se realizaron utilizando una amplia gama de tiempos de contacto, temperaturas y niveles de desafío orgánico.



Potencia letal formulada de amplio espectro.

Formulado para superar los problemas de espectro y actividad limitados de otros desinfectantes, Virkon® S logra la desactivación y la destrucción del patógeno objetivo a través de una serie de reacciones de oxidación no selectiva y de amplio espectro. A diferencia de otras químicas desinfectantes, tales como los aldehídos, Virkon® S no ejerce un efecto toxicológico específico en los animales, y está comprobado que elimina patógenos en cuestión de segundos.

Actúa en el laboratorio. Actúa en la granja.

La eficacia comprobada en la granja ofrece seguridad a los productores, y la certeza de saber que el producto que utilizan será eficaz en las condiciones reales de un establecimiento agropecuario, en el que las bajas temperaturas y los altos niveles de desafíos orgánicos pueden presentar problemas graves a otros desinfectantes.

En trabajos de campo desarrollados por los Centros de Epidemiología y Salud Animal del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (USDA), los investigadores confirmaron que Virkon® S es 100% eficaz para erradicar el virus de enfermedad exótica de Newcastle, eliminado así la necesidad del costoso uso de aves centinelas.¹



Excelente control de los patógenos de la intoxicación alimentaria conforme a las normas de prueba EN.

Dada la exigente legislación de la UE sobre el control de *Salmonella* y *Campylobacter* en plena vigencia en la industria avícola, Virkon® S se ha reevaluado en la Universidad de Wageningen en los Países Bajos, teniendo en cuenta, específicamente, la legislación de la UE. Los estudios más recientes EN 1656 sobre *Salmonella* y *Campylobacter* confirmaron que Virkon® S logró tasas de dilución excelentes de 1:100 y 1:200 contra las cepas más prevalentes de *Salmonella* responsables de intoxicación alimentaria, incluyendo *S. enteritidis*, *S. typhimurium*, *S. virchow*, *S. infantis* y *S. hadar*, y *Campylobacter jejuni*.



El desinfectante de referencia para los baños de desinfección de calzado, dada su rápida eliminación.

Ensayos de campo independientes han demostrado que muchos tipos de desinfectantes no son prácticos para los baños de desinfección de calzado debido a su lenta tasa de eliminación. Los investigadores de la Universidad de Purdue en Indiana, EE.UU., compararon la acción de los desinfectantes de seis clases líderes,² y hallaron que solo el desinfectante QAC brindaba desinfección adecuada para el baño de desinfección de botas, pero necesitando para ello un período de remojo poco práctico de 5 minutos tras la limpieza de las botas. Sin embargo, cuando se evaluó Virkon® S bajo circunstancias similares, se logró una desinfección eficaz en solamente 30 segundos tras la limpieza de las botas.³ 'El estudio confirmó que Virkon® S logró una excelente rapidez de eliminación a bajas temperaturas y en presencia de desafío orgánico.



Beneficios operativos. Porque Virkon® S sencillamente ofrece más.

Sin necesidad de rotación.

Estudios independientes han demostrado que es menos probable que Virkon® S favorezca el desarrollo de resistencia adquirida comparado con otras químicas desinfectantes, eliminando así la necesidad de rotar los desinfectantes.^{4,5}

Mayor seguridad para el operador.

La inversión para evaluar la seguridad de los usuarios de Virkon® S ha sido considerable. Esta evaluación ha demostrado que Virkon® S no es corrosivo para la piel, y que no causa sensibilización. Se ha demostrado que una dilución de uso típico de 1:100 (1%) no causa irritación en la piel ni los ojos, y que no es un agente sensibilizador.


Acción eficaz a baja temperatura.

La capacidad de un desinfectante de tener buena eficacia a bajas temperaturas contribuye al valor de su uso diario. Está bien establecido que la eficacia de los desinfectantes puede disminuir a medida que baja la temperatura. Además, se ha demostrado que el formaldehído tiene una menor acción biocida al bajar la temperatura. Por el contrario, Virkon® S mantiene actividad contra diversos virus a 4°C.

Fácil de transportar y conservar.

Virkon® S puede transportarse de manera rápida y conveniente por tren, por mar y por aire. No está clasificado como «producto peligroso de transportar», lo que reduce su costo de embarque y no exige la presencia de personal calificado en el transporte de productos peligrosos. Las complejidades y restricciones aplicadas al embarque de productos peligrosos pueden prolongar los tiempos de entrega.

Gracias a su estabilidad, la potente formulación de Virkon® S simplifica su almacenaje, y, por lo tanto, puede conservarse por períodos prolongados, facilitando así el almacenaje a granel de grandes cantidades de producto.





Perfil ambiental.

La química a base de oxígeno de Virkon® S incorpora ácidos orgánicos y sales inorgánicas simples. El principio activo se degrada a través de diversas rutas en el medio ambiente, en la tierra y el agua, transformándose en sustancias naturales tales como sales de potasio y oxígeno. Los componentes orgánicos principales se clasifican como biodegradables conforme a los métodos de prueba de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea (UE).

Virkon® S no está considerado como persistente en el medio ambiente, conforme a los procesos europeos estándar para la clasificación y el etiquetado de preparaciones químicas. Estudios independientes han demostrado que el producto Virkon® S diluido, utilizado según las instrucciones, no debe suponer ningún riesgo directo a las instalaciones de tratamiento de aguas cloacales.⁶

Nebulización aérea en presencia de animales.

Durante los brotes de enfermedades respiratorias, o cuando exista tal riesgo, Virkon® S puede aplicarse como desinfectante aéreo cuando los animales están presentes, para disminuir la carga de patógenos ambientales, reduciendo el potencial de contaminación cruzada.⁷ Siempre es importante leer la etiqueta del Virkon® S para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.


Bioseguridad en un solo envase.

Virkon® S ofrece a los productores un sistema de bioseguridad multiuso y conveniente en un mismo envase, para una amplia gama de aplicaciones.

- Superficies
- Equipo
- Vehículos
- Desinfección aérea
- Sistemas de suministro de agua

Apoya la reducción del uso de antibióticos.

Los gobiernos de todo el mundo están procurando reducir el uso de antibióticos en el ganado a fin de limitar el desarrollo de resistencia farmacológica, que puede pasar a la población humana. La legislación dirigida a reducir el uso de antibióticos profilácticos en la cadena alimentaria se está convirtiendo en una realidad. En consecuencia, es fundamental que los productores hagan lo necesario para mejorar sus medidas de seguridad.



Con eficacia comprobada en una amplia gama de desafíos de bioseguridad en el mundo real tanto contra virus como contra bacterias, Virkon® S ha demostrado ser fundamental para combatir los efectos de virus y bacterias en la producción ganadera. Como uno de los desinfectantes preferidos por gobiernos de todo el mundo, Virkon® S sigue marcando el rumbo en lo que se refiere a programas de prácticas recomendadas en el tema de la bioseguridad.

Guía de Aplicación y Uso

Desinfección de superficies y equipos

Desinfección de superficies	Tasa de dilución	Aplicación
Desinfección de rutina de todas las superficies, tierra, madera y hormigón	1:100 (10 gramos de Virkon® S por cada litro (1) de agua)	Si se usa una lavadora a presión u otro pulverizador mecánico, la tasa de aplicación de la solución de Virkon® S debe ser de 300ml/m².

Tabla de uso para la aplicación en superficie

Para estimar la superficie total a desinfectar, incluyendo las paredes y los cielos rasos, multiplique la superficie total del suelo por 2,5.*

Superficie a desinfectar	Volumen de agua requerido	Tasa de dilución		
		Desinfección de rutina, y Órdenes Generales de UK DEFRA 1:100 (1%)	1:200 (0,5%)	Órdenes de UK DEFRA para las enfermedades aviarias 1:280
		Cantidad de Virkon® S a añadir		
50m²	15 litros	150g	75g	54g
100m²	30 litros	300g	150g	107g
500m²	150 litros	1,5kg	750g	536g
1000m²	300 litros	3kg	1,5kg	1,071 kg
2500m²	750 litros	7,5kg	3,75kg	2,68kg

1. Decida el volumen de solución desinfectante necesario con la tasa de dilución apropiada.
2. Mida la cantidad apropiada de Virkon® S en polvo para obtener la tasa de dilución deseada.
3. Agregue al agua el Virkon® S en polvo y agite vigorosamente para disolverlo
4. Si se usa una lavadora a presión u otro pulverizador mecánico, la tasa de aplicación de la solución de Virkon® S debe ser de 300ml/m².
5. Deberá limpiar y dejar secar todas las superficies antes de la desinfección.

*Este cálculo es una guía basada en las tasas de conversión del Reino Unido, y refleja el uso en edificios con superficies semiporosas. Le rogamos consultar los requisitos regionales/nacionales específicos.

Guía de Aplicación y Uso

Desinfección del equipo

Desinfección del equipo	Tasa de dilución	Aplicación
Limpieza y desinfección de rutina de equipos móviles	1:100 (10 gramos de Virkon® S por cada litro (1) de agua)	Utilizando un cepillo o una lavadora a presión, lave todo el equipo con la solución de Virkon® S hasta que se vea limpio.

Baño desinfectante de calzado: preparación y uso:

Desinfección	Tasa de dilución	Aplicación
Desinfección de rutina de calzado	1:100 (10 gramos de Virkon® S por cada litro (1) de agua)	Reemplace la solución cuando esté sucia o al cabo de un período de 4–5 días.

Desinfección del sistema de agua

Desinfección de terminal y continua: todos los sistemas de agua tienen el potencial de contener cierta contaminación viral o bacteriana, en especial los tanques colectores, en los que se puede acumular polvo y detritos. La desinfección limpia el sistema y elimina virus, bacterias y el desarrollo de hongos.

Desinfección del sistema de agua	Tasa de dilución	Aplicación
Desinfección de terminal	1:200 a 1:100	<p>Aísle el suministro al tanque colector, y drénelo utilizando los bebederos más alejados del tanque. Limpie toda suciedad y detrito evidentes. Vuelva a llenar el tanque con agua y añada el volumen apropiado de Virkon® S en polvo, agite vigorosamente y deje en reposo durante 10 minutos. Descargue el agua por todos los bebederos, y espere otros 50 minutos antes de drenar el sistema y volverlo a llenar con agua limpia.</p> <p>En la etapa de desinfección terminal, la acumulación de biopelícula en las tuberías de irrigación es una dificultad conocida, y recomendamos tiempos de contacto más prolongados para tratar este problema. Siga las instrucciones que anteceden pero aumente el tiempo de remojo a un mínimo de 4 horas.</p>
Desinfección continua	1:1000	Dosifique el tanque colector según sea necesario, o aplique a través de un equipo dosificador de sistema de agua.

Tabla de uso de Virkon® S para la desinfección del agua

	Tasa de dilución		
	Terminal de rutina 1:200	Terminal de Alto Riesgo de Enfermedad 1:100	Desinfección continua del agua 1:1000
Litros de agua a desinfectar	Cantidad de Virkon® S a añadir		
100 litros	500g	1 kg	100g
250 litros	1.25 kg	2.5 kg	250g
500 litros	2.5 kg	5 kg	500g
1000 litros	5 kg	10kg	1 kg

Desinfección aérea

Pulverización/atomización aérea, nebulización en frío y térmica

Para facilitar el control de organismos que puedan ingresar en un edificio durante la etapa de instalación, y para desinfectar las áreas inaccesibles del edificio y el aire, use un pulverizador de rocío fino o una máquina de nebulización térmica para aplicar la solución desinfectante Virkon® S uniformemente. La desinfección aérea también puede ayudar a controlar toda contaminación introducida a las superficies del edificio a través de partículas de materia suspendidas en el aire y presentes en el ambiente.

Desinfección del equipo	Tasa de dilución	Aplicación
Pulverización / Atomización aérea	1:200	Use una lavadora a presión o una mochila pulverizadora programada en rocío fino; aplique 20ml de solución de Virkon® S por cada m ³ de espacio aéreo.*
Nebulización en frío	1:100	Use un nebulizador mecánico para aplicar la solución de Virkon® S en una tasa de 40ml por cada m ³ de espacio aéreo.
Nebulización térmica	Solución de Virkon® S de 1:25 (4%) en una mezcla 90:10 de agua y Potenciador de Nebulización Virkon® S	Utilizando una máquina de nebulización térmica, aplique la solución preparada a una tasa de 10ml por cada m ³ de espacio aéreo.

* Equivalente a aproximadamente 1 litro de solución de Virkon® S por cada 20m² de superficie cubierta. *Los cálculos en la tabla son una guía basada en las tasas de conversión del Reino Unido, y refleja el uso en edificios con superficies semiporosas. Le rogamos consultar los requisitos regionales/nacionales específicos.

Desinfección aérea en presencia de aves

- En presencia de aves, Virkon® S puede pulverizarse con una tasa de dilución de 1:200 (0,5%).
- Debe emplearse un nebulizador en frío o un pulverizador.
- Siempre lea la etiqueta del Virkon® S para asegurar el cumplimiento de la normativa vigente.

Eficacia de amplio espectro comprobada.

Datos de actividad virucida

Enfermedad avícola/Afección relacionada	Familia del virus	Tasa de dilución	Tiempo de contacto (minutos)
Síndrome de baja postura (EDS)	<i>Adenoviridae</i>	1:100	10
Virus de la enfermedad infecciosa de la bolsa (Gumboro)	<i>Birnaviridae</i>	1:250 1:200	30 10
Virus de anemia infecciosa aviar (CAV)	<i>Circoviridae</i>	1:250	30
Bronquitis infecciosa	<i>Coronaviridae</i>	1:200	1
Enfermedad de Marek	<i>Herpesviridae</i>	1:200	10
Laringotraqueítis infecciosa (ILT)		1:200	10
Influenza aviar (H7N1)	<i>Orthomyxoviridae</i>	1:320	30
Influenza aviar (H5N1)		1:800	5
Influenza aviar (H7N9)		1:600	10
Influenza aviar (H7N9)		1:200	1
Enfermedad de Newcastle (NVD) (Aprobación de DEFRA)	<i>Paramyxoviridae</i>	1:280	30
Enfermedad de Newcastle (NVD)		1:200	1
Rinotraqueítis del pavo (TRT)		1:200	30
Viruela aviar	<i>Poxviridae</i>	1:100	15
Reovirus aviar	<i>Reoviridae</i>	1:100	10
Leucosis mieloide	<i>Retroviridae</i>	1:200	30

Datos de actividad fungicida

Enfermedad avícola/Afección relacionada	Patógeno	Tasa de dilución	Tiempo de contacto (minutos)
Aspergilosis (incubadora)	<i>Aspergillus fumigatus</i>	1:100	5
Aspergilosis	<i>Aspergillus niger</i>	1:25	30
Infecciones del esófago y el buche	<i>Candida albicans</i>	1:100	10
Dermatofitosis	<i>Trichophyton mentagrophytes</i>	1:50	10

Los usos especificados y las declaraciones registradas con Virkon® S pueden variar entre los distintos países. Consulte directamente a LANXESS para verificar los usos aprobados específicamente para su país. Vea los datos de contacto en la página 14.

Datos de actividad bactericida

Enfermedad avícola/Afección relacionada	Patógeno	Tasa de dilución	Tiempo de contacto (minutos)
Intoxicación alimentaria - humanos	<i>Bacillus cereus</i>	1:100	10
Coriza del pavo	<i>Bordetella avium</i>	1:100	10
Espiroquetosis	<i>Brachyspira pilosicoli</i>	1:3333	10
	<i>Brachyspira hyodysenteriae</i>	1:3333	10
Intoxicación alimentaria - humanos	<i>Campylobacter coli</i>	1:100	5
	<i>Campylobacter jejuni</i>	1:100	5
	<i>Campylobacter jejuni</i>	1:200	30
	<i>Campylobacter pyloridis</i>	1:100	10
Psitacosis	<i>Chlamydophila psittaci</i>	1:100	10
Enteritis necrótica	<i>Clostridium perfringens</i>	1:100	10
Septicemia, artritis en pavos	<i>Erysipelothrix rhusiopathiae</i>	1:100	10
Enteritis	<i>Escherichia coli</i>	1:200	5
Diversas infecciones – humanas	<i>Escherichia coli</i> , cepa ESBL	1:100	10
Intoxicación alimentaria - humanos	<i>Escherichia coli</i> , cepa O157:H7	1:100	5
Mortalidad embrionaria	<i>Klebsiella pneumoniae</i>	1:100	10
Diversas infecciones – humanas	<i>Klebsiella pneumoniae</i> , cepa ESBL	1:100	10
Intoxicación alimentaria - humanos, septicemia en aves	<i>Listeria monocytogenes</i>	1:100	5
		1:1000	30
Enfermedad respiratoria crónica	<i>Mycoplasma gallisepticum</i>	1:100	10
Enfermedades respiratorias	<i>Ornithobacterium rhinotracheale</i> (ORT)	1:100	15
Cólera aviar	<i>Pasteurella multocida</i>	1:150	5
Infecciones secundarias	<i>Proteus mirabilis</i>	1:200	5
	<i>Proteus vulgaris</i>	1:200	30
Infección respiratoria, septicemia	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	1:200	5
		1:1000	30
Infección de paracolon en pavos	<i>Salmonella arizona</i>	1:100	15
Intoxicación alimentaria - humanos	<i>Salmonella choleraesuis</i>	1:100	10
	<i>Salmonella enteritidis</i> , cepa PT4	1:100	5
	<i>Salmonella enteritidis</i>	1:200	30
	<i>Salmonella hadar</i>	1:200	30
	<i>Salmonella infantis</i>	1:200	30
	<i>Salmonella thomasville</i>	1:200	30
Septicemia en pollos, intoxicación alimentaria - humanos	<i>Salmonella typhimurium</i> , cepa DT104	1:200	30
Intoxicación alimentaria - humanos	<i>Salmonella enteritidis</i> (DEFRA)	1:100	30
Artritis y septicemia en pavos, onfalitis en pollos	<i>Staphylococcus aureus</i>	1:100	0.5
		1:200	30
Septicemia en aves	<i>Streptococcus zooepidemicus</i>	1:100	5

Referencias

1. *Use of sentinel chickens to evaluate the effectiveness of cleaning and disinfection procedures in non-commercial poultry operations infected with exotic Newcastle disease virus.* Brian J McCluskey et al. J Vet Diagn Invest 18:296-299 (2006).
2. Amass SF et al. *Evaluating the efficacy of boot baths in biosecurity protocols.* J Swine Health Prod 2000; 8:169-173.
3. Amass SF et al. *Evaluation of the efficacy of a peroxygen compound, Virkon® S, as a boot-bath disinfectant.* J Swine Health Prod 2001;9(3):121-123.
4. *Possible associations between Salmonella persistence in poultry houses and resistance to commonly used disinfectants and a putative role of mar.* K.O. Gradel et al./ Veterinary Microbiology 107 (2005) 127-138.
5. Randall, L. P., et al. 2007. *Commonly used farm disinfectants can select for mutant Salmonella enterica serovar typhimurium with decreased susceptibility to biocides and antibiotics without compromising virulence.* J. antimicrob. Chemother. 60, 1273 – 1280.
6. WRc, 1997. Study to determine the toxicity of the virucidal disinfectant Virkon® S to the waterflea (*Daphnia magna*), the earthworm (*Eisenia foetida*) and anaerobic sludge.
7. Las aplicaciones aéreas en presencia de animales están destinadas a la desinfección de superficies y medios de contacto inanimados, para reducir el potencial de contaminación cruzada entre animales. No se pretende tratar o prevenir una condición médica por contacto con el animal.

Use los biocidas con seguridad. Antes de usar, siempre lea la etiqueta y la información sobre el producto.



LANXESS Indústria de Produtos Químicos e Plásticos Ltda.

Av. Maria Coelho de Aguiar, 215, Bloco B,
2º Andar
05804-902, São Paulo - SP
Brazil

Tel. +55 (11) 3741 2769

biosecurity@lanxess.com

biosecurity.LATAM@lanxess.com

virkon.com

biosecuritysolutions.lanxess.com

Esta información y nuestros consejos técnicos -ya sean verbales, escritos o en forma de ensayos - están sujetos a cambios sin previo aviso y se dan de buena fe, pero sin garantía alguna, expresa o implícita, y esto también se aplica cuando están implicados derechos de propiedad de terceros. Nuestro asesoramiento no le exime de la obligación de verificar la información actualmente proporcionada - especialmente la contenida en nuestras fichas de datos de seguridad e información técnica - y de probar nuestros productos en cuanto a su idoneidad para los procesos y usos previstos. La aplicación, el uso y el procesamiento de nuestros productos y de los productos fabricados por usted basados en nuestro asesoramiento técnico están fuera de nuestro control y, por lo tanto, son de su entera responsabilidad. Nuestros productos se venden de acuerdo con la versión actual de nuestras Condiciones Generales de Venta y Suministro.

Los usos especificados y las declaraciones registradas para el producto pueden variar de un país a otro. Por favor, póngase en contacto con LANXESS para verificar los usos aprobados en cada país.





Potente desinfectante virucida
de amplio espectro



10 motivos por los que poner en manos de Virkon® S la bioseguridad de una granja avícola.

1. Virkon® S redefinió la bioseguridad en la granja y está a la vanguardia de las medidas de control de enfermedades en caso de emergencia
2. Aprobado por gobiernos del mundo entero para combatir enfermedades importantes tales como la enfermedad de Newcastle, la enfermedad de bursitis infecciosa, la muy patógena influenza aviar, y muchas más
3. Es el único desinfectante de marca al que se hace referencia en el AUSVETPLAN 2008, el plan de control de enfermedades en caso de emergencia de Australia y Nueva Zelanda
4. Es el desinfectante de referencia para los baños desinfectantes de botas porque elimina patógenos 10 veces más rápido que el competidor más próximo en velocidad, incluso a bajas temperaturas y en presencia de desafío orgánico^{2,5}
5. Se ha comprobado independientemente en ensayos de campo su elevada eficacia contra la peor amenaza al ganado: los virus
6. La rotación de productos es innecesaria, y ha demostrado reducir el potencial de infección de las supercepas de Salmonella resistentes
7. Mayor seguridad para el operador, y puede pulverizarse en presencia de animales
8. Formulado para incluir componentes minuciosamente seleccionados por sus propiedades de degradación natural en el medio ambiente
9. Fácil de almacenar y de transportar por tren, mar o aire, sin necesidades ni costos adicionales de almacenaje o transporte
10. Bioseguridad en un solo envase para superficies, equipos, vehículos, desinfección aérea y sistemas de suministro de agua

©2023 LANXESS. Virkon®, LANXESS, el logotipo de LANXESS y cualquier logotipo asociado son marcas comerciales propiedad de LANXESS Deutschland GmbH o sus filiales. Todas las marcas comerciales están registradas en diferentes países del mundo.

Más información en virkon.com

